MAATALOUS

Varastokauden hintataso on monena vuonna laskenut tarpeettoman alas. Nyt tähän ei ole syytä. **KASVINVILJELYASIAMIES MIKA VIRTANEN, MTK**

Porkkanasadosta selvästi viimevuotista pienempi

Myöhästynyt kasvukausi on leikannut hehtaarisatoja. Viljelyalaa on noin kymmenen prosenttia viimevuotista vähemmän.

Hausjärveläisen **Heikki Ruposen** 20 porkkanahehtaarista on nostettu kaksi. Nyt nostettu porkkana menee suoraan myyntiin. Varastoporkkanan nosto alkaa syyskuun lopussa.

Satoa on odotettavissa viime vuotta vähemmän. Lämpöä ei ole riittänyt normaaliin kasvuun. Ruposen mukaan varhais- ja varastoporkkanoiden välille on tullut säiden takia kuilu.

”Varhaisin lajike on jaksanut kasvaa normaalisti, seuraaviin lajikkeisiin mentäessä koko putoaa ja sato tippuu.”

Lisäksi hämäläisiä porkkanoita on vaivannut kuivuus. Viileää ja kuuroista alkukesää seurannut vähäsateinen heinäkuu vaati veronsa.

”Varsinkin hiekkamaalla näkee naatista, että vedenpuute on hidastanut kasvua. Naatit ovat laskeutuneet alas.”

Viime viikonvaihteen kuurot virkistivät kasvustoja. Ensi viikoille ennustetut sateet kuitenkin huolettavat viljelijää.

”Myöhään tulevat sateet haittaavat sadonkorjuuta. Kaiken pitäisi tulla aikanaan.”

Viidennes viime vuotta vähemmän

MTK:n kasvinviljelyasiamiehen **Mika Virtasen** mukaan porkkanan satotaso on tänä vuonna 20 prosenttia viimevuotista pienempi. Merkittävin syy on viljelypinta-alan väheneminen. Porkkanaa viljeltiin tänä vuonna vajaat kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Lisäksi satotasoa laskee kasvukauden myöhästyminen. Viileä kesä on viivästyttänyt varastolajikkeiden kasvua 1–2 viikkoa.

Virtasen mukaan tarvittaisiin vielä lämmin jakso, jotta varastoporkkana ehtisi kasvaa tarpeeksi ennen nostoa. Sääennusteet eivät kuitenkaan lupaa hyvää.

Hintataso on nyt tilanteeseen nähden kohdillaan, Virtanen kertoo. Hän toivoo, että hinnat muuttuisivat maltillisesti, kun nostot syksyllä alkavat.

”Varastokauden hintataso on monena vuonna laskenut tarpeettoman alas. Nyt tähän ei ole syytä.”

Ruponen on samoilla linjoilla.

”Hinnat ovat hyvin reagoineet tarjonnan niukkuuteen. Toivotaan, että talvikauden hinta jää satoa vastaavalle tasolle.”

KATJA SAHLSTEDT
HARRI NURMINEN

Heikki Ruponen nosti porkkanaa tilallaan Oitissa torstaina. Alkukesän sadekuurojen jälkeen on ollut kuivaa, ja se näkyy porkkanan koossa.

Varhaisporkkanat kasvoivat normaalisti, mutta varastoporkkanoille ei riittänyt lämpöä, Heikki Ruponen kertoo.

Vihannesten viljelyalat pienentyneet viime vuodesta

Useimpien vihannesten viljelyalat ovat pienentyneet viime vuodesta. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastojen mukaan eniten ovat vähentyneet tarhaherneen ja porkkanan alat.

Hernettä on viljelty tänä vuonna 232 hehtaaria ja porkkanaa 160 hehtaaria vähemmän kuin viime vuonna.

Parsakaalin ja rapeakeräsalaatin viljelyalat ovat jonkin verran kasvaneet. Sipulin ala on pudonnut 16 hehtaaria 1 100 hehtaariin.

Suhteellisesti eniten on vähentynyt punakaalin pinta-ala. 23 prosentin muutos vastaa kuitenkin vain seitsemää peltohehtaaria.

Herneen vajaassa 2 800 hehtaarissa ja porkkanan 1 500 hehtaarissa pienetkin suhteelliset muutokset ovat merkittäviä.

KATJA SAHLSTEDT

Avomaavihannesten viljelyalat 2011 ja 2012

MT	Ala, ha 2011	Ala, ha 2012	Muutos, %
tarhaherne	2 998	2 766	-7,7
porkkana	1 663	1 503	-9,6
sipuli	1 115	1 099	-1,4
valkokaali	610	553	-9,3
punajuurikas	435	391	-10,1
lanttu	423	369	-12,8
rapeakeräsalaatti	281	297	5,7
kukkakaali	283	285	0,7
parsakaali	167	191	14,4
avomaankurkku	200	182	-9,0
kiinankaali	172	168	-2,3
nauris	82	81	-1,2
punakaali	30	23	-23,3

Lähde: Tike

Vain rapeakeräsalaatin, kukkakaalin ja parsakaalin viljelypinta-alat lisääntyivät viime vuodesta.

Porkkanaa odotetaan markkinoille 20 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Muumiotauti vaivaa taas omenoita

Kypsyviä omenoita uhkaa tänäkin vuonna muumiotauti. Pehmeinä, ruskeina laikkuina ilmenevä sienitauti leviää tuulen välityksellä. Itiöt viihtyvät lämpimässä ja kosteassa.

Muumiotauti on enemmän harrastelijapuutarhureiden kuin ammattilaisten ongelma.

”Kotipuutarhoissa puut tapaavat olla isoja. Ammattipuutarhoissa on huolehdittu siitä, että ilma kiertää kunnolla”, kertoo Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkija **Päivi Parikka**.

Parhaiten taudilta voi suojautua pitämällä latvukset väljinä. Tiheässä ja suuressa puussa kosteus ja lämpötila ovat otollisia itiöille.

Suurissa tarhoissa muumiotautia esiintyy vähemmän senkin takia, että omenarupea torjutaan aktiivisesti. Ruven tai tuholaisten aiheuttamat kuorivauriot tarjoavat tauti-itiöille esteettömän pääsyn omenaan.

Parikan mukaan muumiotauti tarttuu säällä kuin säällä. Varsinkin kesälajikkeet ja ohutkuoriset omenat ovat sille alttiita. Ohueen kuoreen tulee helposti halkeamia, joista tauti pääsee leviämään.

Muumiotauti on yleensä pysyvä ongelma. Se säilyy puissa ja muumiohedelmissä, ja hyönteiset levittävät sitä.

Taudin vaivaamat hedelmät on poistettava heti. Itiöt voi tuhota polttamalla hedelmät tai laittamalla ne lämpökompostoriin.

Muumiotauti leviää tiheässä latvuksessa, kun kosteus ja lämpö eivät pääse haihtumaan.

KATJA SAHLSTEDT

Rehun kallistuminen pienentää broilerin tuotantoa

Moni saksalaistila heiluu konkurssin partaalla

Siipikarjatiloilla on mennyt alkuvuoden ajan hyvin sekä Yhdysvalloissa että Venäjällä. Tuotanto- ja vientimäärissä on rikottu ennätyksiä.

Sen sijaan Euroopassa kasvu on hidasta, ja ala painiskelee jo vaikeuksissa ennätyskalliin rehun vuoksi.

Myös Yhdysvaltain broileritiloille vaikeampien aikojen ennustetaan koittavan loppuvuoden aikana.

Huippuluvuista kohti hiljaisempaa ensi vuotta

Alkuvuoden aikana broilerituotanto on Yhdysvaltain maatalousministeriön (Usda) mukaan kasvanut maassa hienoisesti edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Samaan aikaan broilerin kulutus jatkaa hidasta vähenemistään.

USA on kasvattanut voimakkaasti broilerin, kalkkunan ja ankan vientiä. Kiloissa mitaten vienti kasvoi 12 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan, kertoo World Poultry -verkkolehti.

Huomattavasti enemmän kasvoi viennin arvo, sillä se oli peräti 25 prosenttia vuodentakaista suurempi.

EU-alue ei tällä hetkellä kuulu Yhdysvaltain tärkeisiin vientimaihin. USA vei siipikarjanlihaa eniten Venäjälle, Kuubaan, Angolaan ja Meksikoon.

Myös Venäjällä broilerin tuotantomäärät ovat olleet alkuvuonna voimakkaassa kasvussa, kertoo Uutistoimisto Bloomberg. Venäjän tilastokeskuksen tietojen mukaan maassa tuotettiin broileria heinäkuussa lähes neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin.

Heinäkuun tuotantomäärä oli 285 miljoonaa kiloa.

Vaikeammat ajat ovat kuitenkin koittamassa. Nopeasti kohoavat soija- ja maissirehun hinnat ajavat yhdysvaltalaistuottajia pienentämään tuotantoa, ennustaa maan maatalousministeriö Poultry Production News -verkkolehden mukaan.

Tuotannon laskun ennustetaan alkavan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Viennin kasvu on Usdan mukaan tyhjentänyt myös Yhdysvaltain pakastebroilerivarastoja.

Saksassa vaaditaan hinnankorotusta

Euroopassa kallis rehu tuntuu tiloilla jo voimakkaasti.

Uutistoimisto Reutersin mukaan saksalaiset broilerintuottajat vaativat pikaista korotusta lihan tuottajahintaan. Ennätyskorkeat rehukustannukset ovat ajaneet monet tilat niin ahtaalle, että odotettavissa on vararikkoja, ennustaa Reutersin siteeraama broileriteollisuuden etujärjestö ZDG.

Järjestö vaatii, että lihaa ostavat välittäjät nostavat pikaisesti broilerin ja kalkkunan tuottajahintaa vastaamaan kohonneita tuotantokustannuksia.

”Ilman korotuksia tuottajat joutuvat leikkaamaan tuotantomääriä”, ZDG ennustaa.

JUHANI REKU