

|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |     |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 001 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 13 | 19 | 25 | 36  | 48 | 55 | 69 | 75 | 90 | 96 | 100 |
| 0   | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 |    |    |    |    |    |    |     |
|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |     |

Keskiviikkona 29. heinäkuuta 2015

MAASEUDUN TULEVAISUUS

13

# MAATALOUS



Viitasaarelaisen Sami Wiikin seosviljapelloilla ohra, kaura ja vehnä tuottavat kehnoa satoa liiallisen kosteuden takia.

## Viileys ja märkyys lykkäävät sadonkorjuuta

Etenkin vihannesten ja viljojen kehitys on yli kaksi viikkoa jäljessä normaalista. Nurmille viileys sopii, mutta märkyys haittaa monin paikoin etenkin korjuuta.

.....

Heinäkuun viileys on hidastanut kaikkien viljelykasvien, mutta erityisesti avomaanvihannesten kasvua ja kehitystä, kertoo Pro Agrian valtakunnallinen kasvutilannekatsaus.

Varhaisvihannesten sato on ollut hieman tavanomaista pienempi mutta laatu hyvä.

Puintien alkua näyttää venyvän jopa elokuun lopulle, sillä kasvukausi on valtaosassa maata runsaat kaksi viikkoa jäljessä tavanomaisesta. Sateisimmilla

alueilla Etelä-Suomessa ja Kymenlaaksossa takamatkaa on jopa neljä viikkoa.

Kasvustot kaipaisivat nyt kiipeästi lämpöä ja taukoa sateista, jotta sadot ehtivät valmistua.

Sateisimmilla alueilla heinäkuun sademäärät ovat olleet puolitoistakertaiset keskimääräiseen verrattuna. Tila- ja lohkokoitaiset erot ovat suuria.

Parhaiten ovat selviytyneet aikaisin kylvetyt lohkot, syysviljat ja säilörehunurmet.

### Kuivaheinän teossa pahoja vaikeuksia

Sateet ovat häirinneet pahasti etenkin kuivaheinän korjuuta, ja osa sadosta on mennyt pilalle tai jouduttu korjaamaan säilöheinäksi.

Heinäsato arvioidaan määrällään keskinkertaiseksi, mutta tilojen väliset erot ovat suuret. Sato on laadultaan tavanomaisista heikompaa.

Ylen uutisen mukaan heinäntuottajat pelkäävät, että ensi talvena esimerkiksi osalla he-

vostiloista voidaan joutua turvautumaan jopa tuontiheinään. Esimerkiksi Pohjanmaalla kuivaa heinää on saatu korjattua todella huonosti.

Toisen säilörehusadon korjuu alkoi etelässä viime viikolla. Täyteen vauhtiin korjuu on pääsemässä tämän ja ensi viikon aikana maan etelä- ja keskiosissa.

Pohjoisessa ensimmäisen säilörehusadon korjuu on vielä kesken monella tilalla. Lapissa toista säilörehusata päästään korjaamaan ehkä elokuun puolivälissä.

Toisen sadon korjuuta on myöhästyttänyt peltojen märkyys. Satonäkymät vaihtelevat normaalista hyvään. Pohjanmaalla nurmien satonäkymät ovat välttävät.

### Viljat toistaiseksi hyvin pystyssä

Syysviljat ja kaura ovat toistaiseksi pysyneet hyvin pystyssä.

Ruis on maan eteläosassa tulossa taikinatuulentumisvaiheeseen. Puinnin alkamista

saataneen odotella elokuun puoliväliin. Syysvehnäkasvustojen kehitys on hieman ruista jäljessä.

Rukiista ja syysvehnästä odotetaan hyvää satoa, mikäli sateet lakkaavat ja sato päästään korjaamaan hyvissä oloissa. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa ruissadon arvioidaan jäävän tavanomaista pienemmäksi.

Kevätviljojen sato arvioidaan normaalkiksi tai normaalialue heikommaksi. Se on jäämässä tavanomaista pienemmäksi Etelä-Suomen rannikolla, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ainoastaan Etelä-Karjalassa sato arvioidaan hyväksi.

Ohrakasvustot ovat selviytyneet vaikeista sääoloista kevätilviljoista heikoimmin. Ne arvioidaan normaaleiksi ainoastaan Etelä-Karjalassa ja -Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Kaurasato on jäämässä tavanomaista heikommaksi Hämeessä, Pohjois-Savossa ja maan

pohjoisosissa. Osa lohkoista kärsii liiallisesta märkydestä. Kosteaa sää on lisännyt lehti-laikkutautien ja punahomeen riskiä viljoilla, mistä johtuen torjuntaruiskutuksia on tehty edellisvuosia enemmän.

### Kosteus kasvattaa tautiriskejä

Kesän viileys ja runsaat sateet ovat hidastaneet myös perunan kasvua.

Kasvustojen kunto ja kehitysvaihe vaihtelevat suuresti. Märkyys on paikoin tuhonnut kasvustoja.

Varastoperunat ovat aloittaneet kukintansa Pohjanmaata myöten. Kosteaa sää suosii ruton leviämistä, mikä vaatii tiloilta toistuvaa torjuntaa.

Perunan sato-odotukset vaihtelevat välttävästä tyydyttävään. Kesäperunan sato arvioidaan varastoperunaa paremmaksi.

Vihanneksista viileydestä ovat kärsineet eniten herne, kesäkurpitsa ja avomaan kurkku. Vihannesten kasvu on vielä kes-

ken, joten tulevien viikkojen sää ratkaisee sadon osalta paljon.

Sokerijuurikkaan satonäkymät vaihtelevat välttävästä normaaliin ja kosteus lisää laikkutaudin riskiä. Härkäpapukasvustoissa on havaittu tavallista enemmän suklaalaikkua.

### Rypsikasvustot välttäviä

Aikaisimmat rypsit ovat päättäneet kukintansa etelässä ja myöhäisimmät kukkivat parhaillaan. Viileys on venyttänyt kukintajakson poikkeuksellisen pitkäksi. Ei ole varmaa, ehtivätkö myöhäisimmät valmistua syyskuun aikana.

Kasvustojen kunto on pääasiassa välttävä. Myös rypsilillä sateet lisäävät tautiriskiä.

Kevätviljojen puintien siirtäminen elo-syyskuun vaihteeseen vähentää mahdollisuuksia lisätä syysviljojen ja -öljykasvien viljelyä, vaikka kiinnostusta niiden viljelyalan lisäämiseen olisi.

TERHI TORIKKA

### Kasvutilannekatsaus



## Märkyys pilasi sadon Keski-Suomessa

### VIITASAARI (MT)

Viitasaaren Keihärinkoskella viljaa viljelevä **Sami Wiik** on menettänyt toivonsa kuluvan satokauden suhteen.

”Olen viljellyt tätä tilaa kymmenen vuotta, eikä koskaan ole ollut näin surkeaa satovuotta. Märkyys on ollut aivan jatkuva riesa, joka on suoraan sanottuna pilannut sadon.”

Wiikin 80 peltotehtaarista valtaosa kasvaa ohraa, kauraa ja vehnää. Loput ovat riistapelloja sekä nurmella.

”Joka tapauksessa sato tulee olemaan parhaimmillaankin korkeintaan keskinkertainen, jos loppukesästä ei enää sada ja on poutasäätä”, Wiik toteaa.

”Mutta kun sääennustuksia seuraa, niin ei loppukesä näytä yhtään tämän paremmalta. Tässä on ainekset katastrofiinkin. Jos vielä tulee kunnolla vettä ja vilja lakooa, voidaan menettää loppu satokin”, hän lisää.

Suuri osa pelloista on sadon osalta menetettyjä tapauksia, mutta joillakin lohkoilla tilanne sentään on parempi.

”Peltokohtainen vaihtelu on hyvin suurta. Olen huomannut useampana vuotena, että jostaakin syystä aikaisin kylvetyt ovat onnistuneet paljon paremmin.”

JUKKA KOIVULA



Liperiläinen Mikko Lihavainen on tyytyväinen nurmisatoon. Ensimmäisen vuoden kasvusto on matala mutta vahva.

## Toisen nurmisadon korjuu alkoi Liperissä tiistaina

### LIPERI (MT)

Aikaiset nurmilajikkeet olivat tänä vuonna onni ainakin Pohjois-Karjalan Liperissä.

”Ne pelastivat. Saatiin tehdä ensimmäinen säilörehusato poutajakson aikaan”, maidontuottaja **Mikko Lihavainen** kertoo.

Hänen tilallaan Liperin Viinijärvellä päästiin aloittamaan toisen nurmirehusadon korjuu eilen tiistaina. Sunnuntaina seudulla vielä satoi rajusti, mutta poutaisen maanantain ansiosta rehun tekoon päästiin suunnitelmien mukaisesti.

Lihavaisen nurmiseoksessa on timoteita, nurminataa ja ruokonataa. Satoja on tarkoitus korjata kolme. Moni lähiseudulla joutuu vielä odottamaan toisen sadon korjuuta, koska ensimmäinen venyi sateiden takia myöhään.

Nurmisato on Lihavaisen arvion mukaan alueella määrällisesti hyvä. ”Tavaraa on paljon, vaikka kasvusto ei ole pitkä. 8 000-

9 000 kilon kuiva-ainesatoon pitäisi päästä.”

Etenkin ensimmäisen ja toisen vuoden nurmet ovat menestyneet hyvin viileässä säässä. Sadepäiviä on ollut paljon, mutta määrät eivät ole olleet kovin suuria.

Sää sopii maitotilalle pääasiassa hyvin. Lehmien ei ole tarvinnut kärsiä helteestä laiturilla, ja laitumet ovat kestäneet hyvässä kunnossa.

”Tietysti poutapäiviä saisi olla useampia, mutta eihän kesä ole koskaan kaikelle hyvä.”

Viljojen korjuuta viileys lykkää.

”Joskus on päästy jo heinäkuussa aloittamaan, mutta nyt voi mennä elokuun loppuun”, Lihavainen arvioi.

Hän viljelee nurmien lisäksi ohraa sekä hernekauraseosta, joka on tarkoitus tehdä säilörehuksi elokuun alussa. ”Siihen ainakin toivoisi poutaviikkoa.”

TERHI TORIKKA

Kasvutilannekatsauksesta lisää takasivulla

Tähkät ovat vielä hyvin pienikokoisia.

SUVI NIEMI



Lumijokelainen Samuli Hemmilä harmittelee kylmää ja märkää kesää, jonka vuoksi ohra kasvaa laukukkaana ja matalana. ”Tällä peltolohkolla on tiivistymisongelmaakin”, hän toteaa.